

## 儿科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 13 期

## 【小儿先天性甲状腺功能减低症】

男婴，40 天。过期产，出生后第 3 天出现黄疸，至今尚未完全消退。生后少哭，少动。吃奶尚可，大便 2 天 1 次，色黄。腹软较胀，有脐疝，肝肋下 2cm，血清总胆红素  $170 \mu\text{mol/L}$ ，结合胆红素  $21 \mu\text{mol/L}$ ，血红蛋白  $110\text{g/L}$ ，RBC  $3.8 \times 10^9/\text{L}$ 。【医学教育网原创】

1. 该儿最可能的诊断是

- A. 新生儿肝炎
- B. 先天性胆道闭锁
- C. 先天性甲状腺功能减低症
- D. 败血症
- E. 先天性巨结肠

【正确答案】C

【答案解析】根据患儿过期产，40 天，出生后 3 天出现黄疸至今未消退，少哭、少动等，腹胀，脐疝，肝肋下 2cm，血清总胆红素  $170 \mu\text{mol/L}$ ，结合胆红素  $21 \mu\text{mol/L}$ 。考虑最可能为先天性甲状腺功能减低症，选择 C 选项。无相关肝炎的家族史提供，排除 A；无胆道闭锁的相关症状和表现，排除 B；败血症是指各种致病菌侵入血液循环，并在血中生长繁殖，产生毒素而发生的急性全身性感染。若侵入血流的细菌被人体防御机能所清除，无明显毒血症症状，排除 D；先天性巨结肠是由于结肠缺乏神经节细胞导致肠管持续痉挛，粪便淤滞于近端结肠，近端结肠肥厚、扩张，所以排除 E 项。

2. 为确诊，应选择哪项检查【医学教育网原创】

- A. 血清病毒特异抗体检测
- B. 肝胆 B 超
- C. 血清  $T_3$ 、 $T_4$ 、TSH 检查
- D. 血培养
- E. 钡剂灌肠

【正确答案】C

【答案解析】先天性甲状腺功能减低症的确诊检查是血清  $T_3$ 、 $T_4$ 、TSH 检查。

### 3. 应及时给予何种治疗

- A. 保肝利胆类药物
- B. 外科手术【医学教育网原创】
- C. 甲状腺素片口服
- D. 应用有效抗生素
- E. 应用抗病毒药

【正确答案】C

【答案解析】先天性甲状腺功能减低症的患儿应及时给与甲状腺素片口服。

【医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任】